

キイロシリアゲアリ (女王アリ)

キイロシリアゲアリ (女王アリ) 活動時期												
								←	→			
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

キイロシリアゲアリの女王アリは、8月下旬から10月(特に9月に多い)に結婚飛行のために巣から飛び出し、灯火に集まります。このため



群れているところを発見され、「ヒアリ」と間違えられ、県内の市町村などに相談がよせられます。



生態

キイロシリアゲアリは、北海道から奄美諸島に分布し、草地や林内に生息し、朽木の根株中、石の下、土中などに巣をつくります。

キイロシリアゲアリの女王アリ
体長：約7.0mm
腹部を背面から観察すると
ハートのような形に見えます。

体長は、女王アリは約7.0mm、雄アリと働

きアリは約2.0から3.0mmです。体色は黄褐色で、女王アリの腹部は大きく目立ちます。

女王アリは翅を持ち、交尾後に翅を落とすので、翅を持つ女王アリと翅を持たない女王アリが観察されます。

- ヒアリのような毒は持っていません。

被害・駆除

いちじてき あたら す はね じょおう おす たいりょう
一時的に、新しい巣をつくるために、翅をもった女王アリや雄アリが大量に
ともしび まど そと も あか あつ ふかいかん あた
灯火や窓から外に漏れた灯りなどに集まり、不快感を与えることがありますが、
が い くじょ ひつよう
ヒトに害を与えることはありませんので駆除する必要はありません。

くじょ ばあい かていよう ふかいがいちゆうよう さつちゆうざい しょう
どうしても駆除をしたい場合は、家庭用の不快害虫用の殺虫剤を使用しま
しょう (しょう さい しゅうへん かんきょう はあく うえ てきせつ しょう
しょう (使用の際は、周辺の環境を把握した上で適切にご使用ください)。

よぼう 予防

しつがい ああ しやこう あみど せっち たいきく
室外に灯りがもれないように遮光カーテンをする、網戸の設置などの対策を
しましょう。

◆ヒアリの女王アリに間違われることが多い

じょおう まちが おお
キイロシリアゲアリの女王アリは、大きさや光沢感、胸部と腹部をつなぐ腹柄
ぶ い ぶい しよつかく かず おな じょおう
とよばれる部位が2つある、触角の数が同じことなどから、ヒアリの女王アリ
まちが おお
と間違われることが多いです。

◆ヒアリ女王との違いについて参考となる環境省のサイト

じょおう じょおう み わ かた かんきょうしょうがいらいせいぶつ
ヒアリ女王とキイロシリアゲアリ女王の見分け方 (H29.10 環境省外来生物

たいさくしつ 対策室

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/file/miwakekata_hiari_kiiro.pdf

さんこうしりょう 参考資料

1. にっぽんさん るいがぞう
日本産アリ類画像データベース

2. かんきょうしょう 環境省 : どうてい ヒアリ同定マニュアル Ver. 3.0 (2023)

3. にほん 日本 かおくがいちゅうがっかい 家屋害虫学会 : かおくがいちゅうじてん 家屋害虫辞典 かぶしきがいしゃいとうえしやいん 株式会社井上書院 (1995)