

	大泉	葦崎	甲府	大月	身延	南部
6月1日	—	—	—	—	—	—
6月2日	—	—	—	—	—	—
6月3日	—	—	—	—	—	—
6月4日	—	—	—	—	—	—
6月5日	—	—	—	—	—	④
6月6日	—	—	—	—	—	—
6月7日	—	—	—	—	—	—
6月8日		①	—	—	—	—
6月9日	—	—	—	—	—	—
6月10日	—	—	—	—	—	—
6月11日	—	—	—	④	—	—
6月12日	③	④	④	—	—	—
6月13日	—	—	—	—	—	●
6月14日	—	—	—	—	—	—
6月15日	—	—	—	④	—	—
6月16日	—	—	—	—	—	—
6月17日	—	—	—	—	—	—
6月18日	—	—	—	—	—	—
6月19日	—	—	—	—	—	—
6月20日	—	—	—	—	—	—
6月21日	—	●	●	—	—	—
6月22日	—	—	—	—	—	—
6月23日	—	—	—	—	—	—
6月24日	—	—	—	—	—	—
6月25日	—	④	●	●	●	●
6月26日	—	●	●	●	●	—
6月27日	—	—	—	—	—	—
6月28日	—	●	●	—	●	●
6月29日	①	—	—	—	—	—
6月30日	—	—	—	—	—	—

(凡例)

好適感染条件	●葉面湿潤時間が8時間以上、 葉面湿潤時間中の平均気温が15～25℃ (ただし、21℃以下の場合は湿潤時間が9～15時間必要)、 その日以前5日間の平均気温が20～25℃
準好適感染条件	①湿潤時間は10時間以上だが、前5日間の平均気温が20℃未満 ②湿潤時間は10時間以上だが、前5日間の平均気温が25℃以上 ③湿潤時間は10時間以上だが、湿潤時間中の平均気温が15～25℃の範囲外 ④湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間数よりも短い

	大泉	葦崎	甲府	大月	身延	南部
7月1日	—	—	—	—	—	—
7月2日	—	—	—	—	—	—
7月3日	—	—	—	—	—	—
7月4日	—	—	—	—	—	—
7月5日	—	●	●	—	●	●
7月6日	①	—	●	④	●	●
7月7日	①	●	●	●	●	●
7月8日	—	—	—	—	—	—
7月9日	—	—	—	—	—	—
7月10日	—	—	—	—	—	—
7月11日	—	—	—	—	—	—
7月12日	—	—	—	—	—	—
7月13日	—	—	—	—	—	—
7月14日	—	—	—	—	—	—
7月15日	—	—	—	—	—	—
7月16日	—	—	—	—	—	—
7月17日	—	—	③	②	—	—
7月18日	—	—	—	—	—	—
7月19日	②	—	—	—	—	—
7月20日	—	—	—	—	—	—
7月21日	—	—	—	—	—	—
7月22日	②	—	—	—	—	—
7月23日	—	—	—	—	—	—
7月24日	—	—	—	—	—	—
7月25日	—	—	—	—	—	—
7月26日	—	②	—	②	②	—
7月27日	—	—	—	—	—	②
7月28日	—	②	—	②	—	②
7月29日	—	—	—	—	②	—
7月30日	—	—	—	—	—	—
7月31日	—	—	—	—	—	—

(凡例)

好適感染条件	●葉面湿潤時間が8時間以上、 葉面湿潤時間中の平均気温が15～25℃ (ただし、21℃以下の場合は湿潤時間が9～15時間必要)、 前5日間の平均気温が20～25℃
準好適感染条件	①湿潤時間は10時間以上だが、前5日間の平均気温が20℃未満 ②湿潤時間は10時間以上だが、前5日間の平均気温が25℃以上 ③湿潤時間は10時間以上だが、湿潤時間中の平均気温が15～25℃の範囲外 ④湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間数よりも短い

	大泉	葦崎	甲府	大月	身延	南部
8月1日	●	②	－	－	－	－
8月2日	－	－	－	－	－	－
8月3日	－	－	－	－	－	－
8月4日	－	－	－	－	－	－
8月5日	－	－	－	－	－	－
8月6日	－	－	－	－	－	－
8月7日	－	－	－	－	－	－
8月8日	－	－	－	－	－	－
8月9日	－	－	②	－	－	－
8月10日	－	－	－	－	－	－
8月11日	－	－	－	－	－	－
8月12日	－	－	－	－	②	②
8月13日	－	－	－	－	－	－
8月14日						
8月15日						
8月16日						
8月17日						
8月18日						
8月19日						
8月20日						
8月21日						
8月22日						
8月23日						
8月24日						
8月25日						
8月26日						
8月27日						
8月28日						
8月29日						
8月30日						
8月31日						

(凡例)

好適感染条件	●葉面湿潤時間が8時間以上、 葉面湿潤時間中の平均気温が15～25℃ (ただし、21℃以下の場合は湿潤時間が9～15時間必要)、 前5日間の平均気温が20～25℃
準好適感染条件	①湿潤時間は10時間以上だが、前5日間の平均気温が20℃未満 ②湿潤時間は10時間以上だが、前5日間の平均気温が25℃以上 ③湿潤時間は10時間以上だが、湿潤時間中の平均気温が15～25℃の範囲外 ④湿潤時間が湿潤時間中の平均気温ごとに必要な時間数よりも短い