

中国で **アフリカ豚コレラ**の発生が確認されました！

発生状況

〈場所〉 遼寧省(りょうねいしょう)瀋陽市(しんようし)
瀋北新区(しんほくしんく)の養豚繁殖農場 (383頭飼養)

〈経緯〉

8月1日 疑い事例確認 (47頭で死亡)

8月3日 アフリカ豚コレラ確定

口蹄疫と同様に家畜衛生上極めて重要な越境性動物疾病である**アフリカ豚コレラ**は、2007年にロシアで確認されて以降、その発生地域が徐々に拡大しており、今回東アジア地域で発生が初めて確認されました。

飼養衛生管理基準の再確認を！！

豚及びいのししの飼養農家の皆様には、飼養衛生管理基準に基づき、生肉を含み、又は含む可能性がある飼料を給与する場合は、加熱処理(摂氏70度以上で30分間以上又は摂氏80度以上で3分間以上)が適切に行われたものを用いるようお願いします。

また、家畜伝染病の発生地域への渡航を**可能な限り自粛**し、海外渡航者が農場に立ち入らないように注意する、農場訪問者の記録を行うなど**飼養衛生管理基準遵守の再徹底**をお願いします。

※**消毒及び衛生管理区域への病原体持ち込みの防止の再徹底**


- ①衛生管理区域及び畜舎への病原体持ち込みを防止するため、看板を設置する等、必要のない者が立入しないようお願いします。
- ②農場の従業員も含め衛生管理区域及び畜舎に立ち入る場合や物を持ち込む場合には、手指、靴等の消毒その他必要な措置を実施して下さい。

※**早期発見・早期通報の徹底**

毎日の健康観察を入念に行い当該症状を呈している家畜を発見した際は、家畜保健衛生所に連絡をお願いします。

我が国に本病が侵入するリスクが更に高まっています！！

欧州・ロシアにおけるアフリカ豚コレラの発生拡大状況(2007年～)



アフリカ豚コレラの症状

病状は多岐に渡り、甚急性、急性、亜急性、慢性の症状を示す。死亡率は100%に近い。

甚急性：突然死亡

急性：発熱(40～42℃)、食欲不振、粘血便、チアノーゼ等



写真出典：USDA APHIS Plum Island Animal Disease Center

山梨県西部家畜保健衛生所

電話・・・0551-22-0771 / FAX・・・0551-22-6728

夜間・土日・休日の連絡・・・090-5564-1018 または 090-5568-0817