

# ニューカッスル病の予防は 大丈夫ですか？



## ニューカッスル病(家畜伝染病)とは？

近年の国内発生状況

### 1. 原因

ニューカッスル病ウイルス


H19	富山県	採卵鶏	1戸	41,300羽飼養
H20	沖縄県	肉用鶏	1戸	8,000羽飼養
H22	愛媛県	アイガモ	1戸	60羽飼養

### 2. 感染経路

感染鶏から鼻水、涙、排泄物に多量のウイルスが排泄される。  
ウイルス保有鶏の導入、感染野鳥の侵入、汚染物や人による持込により他の鶏群に伝播。

### 3. 臨床症状


緑色下痢便、奇声や開口呼吸などの呼吸器症状。  
脚麻痺や頸部捻転などの神経症状



脚麻痺と頸部捻転

### 4. 予防方法

野鳥の侵入防止、ワクチン接種。



鶏病研究会報、Vol142、2006「総合ワクチネーションプログラム」より抜粋

### 5. 発生時の対応

家畜伝染病予防法に従い、殺処分等の防疫処置がとられる。

## お願い！

- ・ 導入元でのワクチン接種状況を確認し、適切なワクチン接種を実施しましょう。
- ・ 野鳥の侵入を防止しましょう。
- ・ 本病が疑われるような異常鶏を見つけたら家畜保健衛生所までご連絡ください。



山梨県西部家畜保健衛生所

TEL:0551-22-0771 (平日)

090-5564-1018(休日・夜間)

090-5568-0817(休日・夜間)