

# 鹿児島県の採卵鶏農場で 高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜確認！ (家きん国内17例目)

## 【概要】

- ・鹿児島県出水市 採卵鶏 約7万羽
- ・疫学関連農場 鹿児島県出水市(1農場、約0.8万羽)
- ・簡易検査および遺伝子検査で陽性。  
高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。

### <踏み込み消毒槽の作り方と使い方>

踏込消毒槽は、高病原性鳥インフルエンザだけではなく、様々な病原体の侵入リスクを下げるために有効です。**畜舎や農場の出入口に常備**しておきます。

#### ① 準備するもの

消毒薬が10L程度入るプラスチック容器と消毒薬

#### ② 消毒薬は**用法及び用量に従い**調整します。

#### ③ 使用方法

- ・家きん舎出入口には、まず靴底などに付いた泥や糞尿を洗い落とすために水だけ入れた**洗浄槽**と消毒薬を添加した**消毒槽の2つ**を置き、家きん舎への立入及び退出時には、必ず踏み込み消毒を行うようにします。
- ・洗浄槽で長靴に付着している泥や糞尿を洗い落とした後、長靴を消毒槽に浸漬します。洗浄槽がない場合でも、消毒槽に浸透する前には、**長靴を必ず洗浄**して泥などを取り除いておきます。
- ・なお、消毒槽に中蓋(直径5センチくらいの穴を7~8個くらい空けた発泡スチロール)を浮かべて、その上から踏み込むと、中蓋の穴から強い水流が出てきて消毒効果が増します。
- ・泥や糞尿などの有機物が含まれると、消毒薬の効果が落ちますので、洗浄用の水や消毒薬が**汚れたらすぐに交換**するようにします。

#### ①家きん飼養農場の**防鳥ネット**の再確認

#### ②ウイルスの人・車両又は野鳥を含む野生動物を介した

農場内及び家きん舎内への**侵入防止対策**の徹底

#### ③農場周辺の**消石灰散布**など消毒の徹底

※飼養衛生管理状況の点検を行うとともに、

家きんの**特定症状**(1日の死亡率が過去3週間の平均の2倍以上)、

**疑われる症状**(鶏冠・肉垂のチアノーゼ等)を念頭に健康観察を実施し、

**早期発見・早期通報**の徹底をお願いします。

鳥インフルエンザの情報を掲載した農林水産省ウェブサイト：<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html>

異状をみつけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所まで

電話・・・0551-22-0771 FAX・・・0551-22-6728

夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018