

香川県・鹿児島県の家きん農場で 高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜確認！ (家きん国内33・34例目)

【概要】

- ・33例目：香川県三豊市 採卵鶏 約8万羽
- ・34例目：鹿児島県出水市 採卵鶏 約2.2万羽
疫学関連施設 鹿児島出水市 1農場 約7.4万羽
簡易検査および遺伝子検査で陽性。
高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜であることを確認。

<今年例年以上のペースで発生が続いています>

※渡り鳥が飛来するこの時期は全国的にウイルスが持ち込まれる
可能性が高く、**全国いずれの地域**においても**発生リスク**があります。

<農場周囲への消石灰散布>

※鶏舎周辺及び農場敷地周縁へ定期的に**2～3m幅で消石灰を散布**しましょう。
また、農場内道路にも消石灰等を散布しましょう。

※消石灰散布の効果

- ①高病原性鳥インフルエンザウイルスに対する**消毒効果**。
- ②ネズミなどの野生動物に忌避効果(**いやがって近寄らない**)
- ③ネズミなどの野生動物が侵入したかどうか、またどこから侵入したのが足跡等でわかりやすくなる。

◇**早期発見・早期通報**

◇家きん飼養農場の**防鳥ネット**の再確認、**家きん舎の穴**等の再点検

◇ウイルスの人・車両又は野鳥を含む野生動物を介した

農場内及び家きん舎内への**侵入防止対策**の徹底

◇農場周辺の**消石灰散布**など消毒の徹底

◇農場内における**手指や長靴の消毒**

◇適切に消毒効果を得られるよう毎日また汚れた都度**消毒薬の交換**、

消毒前の**長靴の洗浄**等を実施

鳥インフルエンザの情報を掲載した農林水産省ウェブサイト：<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/index.html>

異状をみつけた場合には直ちに山梨県西部家畜保健衛生所まで

電話・・・0551-22-0771 FAX・・・0551-22-6728

夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5564-1018

農場周辺の高病原性鳥インフルエンザのウイルスが 非常に多くなっています！

全国的に高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されています。

これまで以上に、本病の発生予防を徹底しましょう！

家きん舎への人や、野生動物によるウイルスの侵入を防ぐことが
特に重要です！

発生予防対策の特に重要なポイント

- 農場内や家きん舎周囲の消毒は毎日行いましょう！
- 家きん舎等への出入り時に消毒の実施・長靴の交換が適切にできているか、動線が交差していないか、今一度、点検・確認をお願いします！
- 長靴はしっかり汚れを落としてから消毒し、踏込消毒槽などの消毒薬は少なくとも毎日、汚れたらその都度、交換しましょう！
- 農場内や家きん舎の周囲にはウイルスが侵入する経路が多く存在していますので、今一度、点検・確認をお願いします！



◆ 飼養家さんの毎日の健康観察を念入りに行い、異状を見つけた場合は、直ちに最寄りの家畜保健衛生所に連絡してください。

農林水産省HP「鳥インフルエンザに関する情報」→

